



# HPV

kann elva til fleiri sløg  
av krabbameini

- \* Krabbamein í varrum
- \* Krabbamein í munnholu
- \* Krabbamein í svølgj



- \* Krabbamein í varrum
- \* Krabbamein í munnholu
- \* Krabbamein í svølgj

- \* Krabbamein í penis
- \* Krabbamein í baktarminum
- \* Finnur (vortur) á kynsgagnunum

- \* Lívmóðurhálskrabba
- \* Krabbamein í innaru og ytru kynsgagnunum
- \* Krabbamein í baktarminum
- \* Finnur á kynsgagnunum

## Bílegg tíð

HPV-koppseting er partur av barnakoppsetingaráttlanini, og mælt verður til, at øll 12 ára gomul børn fáa koppsetingina. Koppsetingin er ókeypis til børn undir 18 ár.

Bílegg tíð til koppseting hjá kommunulækna. Er barnið 12-14 ár, fær tað tvær koppsetingar við 5-13 mánaða millumbili. Er barnið eldri enn 15 ár, er tørvur á trimum koppsetingum fyri at fáa fulla verju.

Koppseting  
verjir  
barnið

# HPV -KOPPSETING

*ein koppseting fyri  
krabbamein*




Skanna QR - kotuna við myndatólinum á snildtelefonini og les meira um HPV og koppseting.

## Hví skal barnið koppsetast?

- Koppsetingin verjir fyrri HPV, sum kann elva til krabbamein og finnur (vortur) á kynsgøgnunum.
- Kanningar vísa, at vandin fyrri lívmóðurhálskrabba minkar umleið 90%, um koppsetingin verður givin áðrenn fyrstu kynsligu samveru.
- Hjá monnum eru krabbameinstilburðir í varrum, munnholu og svølggrúmi vaksandi og hesi sløg av krabbameini eru nú líka vanlig sum lívmóðurhálskrabbi. Sløk 60% standast av HPV.

### Tilburðir av krabbameini í lívmóðurhálsi, varrum, munnholu og svølg í Færoyum frá 2013-2023.



\* Harumframt vóru 31 tilburðir av byrjandi krabbameini staðfestir.

### Koppsetingin fyrirbyrgir flestu HPV-elvdum tilburðum av krabbameini og fyrirbyrgir finnum á kynsgøgnunum

## HPV smittar við kynsligari samveru

HPV er virus, sum er sera vanligt millum ung, og tað smittar illa. Tú merkir ikki smittuna.

Í flestu førum berjir kroppurin sjálvur smittuna niður, men hjá umleið 1 av 10 verður smittan verandi og kann elva til krabbamein.



Tú kanst blíva smittaður, sjálvst um tú nýtir hit, tí virusið kann vera á húðini rundan um kynsgøgnini. HPV kann tí eisini smitta millum hendur og kynsgøgn.

### Koppsetingin verjir best, um hon verður givin áðrenn fyrstu kynsligu samveruna.

HPV-koppsetingin verjir fyrri níggju sløgum av HPV, sum kunnu elva til krabbamein og finnur (vortur) á kynsgøgnunum.

Besta verjan fæst, um barnið verður koppsett, áðrenn tað er í vanda fyrri at verða smittað við HPV.

Tí mæla vit til, at børn verða koppsett, tá ið tey eru 12 ár.

## Hjáárin

HPV-koppseting kann hava somu hjáárin sum aðrar barnakoppsetingar eitt nú, at húðin rodnar, tað kennist eymt ella hovnar, har prikað er. Summi fáa árin, sum líkjast beinkrími (influenzu), men tað varir stutt.

Álvarslig hjáárin eru sera sjáldsom og vísa seg hjá færri enn 1 av 1000. Tey kunnu t.d. vera ovurviðkvæmi og notusótt (nældefeber). Um álvarslig hjáárin eru, vísa tey seg stutt eftir koppsetingina, og læknin dugir at viðgera tey. Tí skal barnið sita í læknaviðtaluni í umleið 15 minuttir eftir koppsetingina.

Fleiri altjóða kanningar hava víst, at HPV-koppsetingin er trygg og munar væl.



Skanna QR-kotuna við myndatólinum á snildtelefonini og les meira um hjáárin og innihald í koppsetingini.